

# EC FERTİLİZER

## AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

### Basfoliar 36 Extra SL

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Toplam Azot (N)	: % 27
Amonyum Azot'u (NH <sub>4</sub> -N)	: % 3.6
Nitrat Azot'u (NO <sub>3</sub> -N)	: % 4.7
Üre Azot'u (NH <sub>2</sub> -N)	: % 18.7
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0.02
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	: % 0.2
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	: % 0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	: % 1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0.005
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	: % 0.01
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı	: Cu, Fe, Mn ve Zn için 3-7

#### KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

\* Önerilen gübre miktarının en az 40 Litre/da su ile karıştırılması tavsiye edilir.

\* Pasa karşı hassas elma çeşidi Golden Delicious için, meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştıktan sonra uygulamalara başlanılmalıdır.

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA MİKTARI
<b>Buğday, Arpa, Çeltik Ve Diğer Kışlık Tahıllar</b>	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemleri arası 1-2 uygulama. Süt ve hamur olum döneminde, verim ve protein oranını arttırmak amacıyla çiçeklenme sonrası 1-2 uygulama.	Yeteri miktarda suya 200-300 cc/da
<b>Kanola, Ayçiçeği</b>	Çiçeklenme öncesi 15-20 gün ara 1-2 uygulama.	Yeteri miktarda suya 200-300 cc/da
<b>Mısır, Patates, Şeker Pancarı</b>	Bitkilerin 15-20 cm boylanmasından itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama.	Yeteri miktarda suya 200-300 cc/da
<b>Lahana, Karnabahar ve Brokoli</b>	Dikimden 2-3 hafta sonradan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	Yeteri miktarda suya 200-300 cc/da
<b>Sera ve Açık Alan Sebzelerinde</b>	Sebze çeşidi ve ürün miktarına bağlı olarak, gelişim döneminde 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama	Yeteri miktarda suya 200-300 cc/da
<b>Çilek, Bağ ve Diğer Üzümsü Meyvelerde</b>	Çiçeklenmeden önce ve sonra olmak üzere 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama.	100 Litre suya 200-300 cc
<b>Yumuşak Çekirdekli Meyveler</b>	Çiçeklenmeden sonra 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama.	100 Litre suya 250-400 cc
<b>Sert Çekirdekli Meyveler</b>	Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama.	100 Litre suya 250-400 cc
<b>Turunçgiller</b>	Çiçeklenmeden önce 1 uygulama, Çiçeklenmeden sonra meyveler belli büyüklüğüne alana kadar 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama.	100 Litre suya 250-400 cc